VAPE (cigarette électronique) – Son HISTOIRE

CIGARETTE ELECTRONIQUE = VAPE = VAPORISATEUR PERSONNEL

Inventée par des personnes concernées
des usagers du tabac souhaitant sortir de l'usage du tabac

Pas par l'industrie du tabac.

*Le premier dispositif rendu public destiné à simuler l'utilisation d'une vraie **cigarette** a été réalisé en 2003 par Hon Lik, un ancien pharmacien et ingénieur chinois qui a déposé en 2005 un brevet pour une « **cigarette sans fumée à pulvérisation électronique** »*

Toutefois, ce premier dispositif exploite alors la technologie de nébulisation par ultrason

La technologie de vaporisation par résistance chauffante, seule technologie commercialisée pour les cigarettes électroniques actuellement, a été inventée et brevetée vers 2009 par le chinois David Yunqiang Xiu

VAPE (cigarette électronique) – L'avis de l'orateur

UN OUTIL INCONTOURNABLE

VAPE (cigarette électronique) – Pourquoi ?

Positionnement comme un moyen de

Réduction des Risques et des Dommages
(RDRD)

≠ ZERO risque

≠ ZERO dommage

Principe de réalité qui tient compte de l'imperfection humaine

Démarche à plusieurs niveaux qui va au-delà d'une classique balance bénéfice/risque

VAPE (cigarette électronique) – Moyen de Réduction des Risques et des Dommages

RDR arrivée avec le SIDA :

- Si vous ne voulez pas attraper le SIDA => ne vous droguez pas
- Si vous vous droguez => ne vous shootez pas
- Si vous vous shootez => ne partagez pas votre seringue
- Si vous partagez votre seringue => lavez-la à l'eau de javel (*pas pour VHC*)

Objectif recherché

Evénements désirables (*bénéfiques*) >> Evénements indésirables (*dommages*)
(*Médicaments, gestes chirurgicaux, vaccins... trajets en voiture, centrales nucléaires*)

Au minimum, le vapotage s'inscrit dans cette réalité

VAPE (cigarette électronique) – Moyen de Réduction des Risques et des Dommages

BENEFICE

Arrêt d'un produit qui tue la moitié de ses utilisateurs

RISQUE

Principe de précaution

Il ne faudrait pas faire (ne pas utiliser la vape) ... parce qu'on ne saurait pas tout

Politiques sanitaires publiques ≠ GB/France

.....

René DESCARTE (1596-1650)

« Attendre d'en savoir assez en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction »

TABAC – Toxicité cardiovasculaire

Tabac => 2 à 3 fois plus de risque de décès cardiovasculaire

Arrêt du tabac => **Diminution rapide** de la mortalité cardiovasculaire (-36%)

Après 2 ans le risque de maladie coronarienne est diminué de moitié

Traitement/intervention	Estimation de la diminution de la mortalité
Aspirine ⁴⁴	18%
Bêta-bloquants ⁴⁵	23%
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion ^{46,47}	13-14%
Statines ⁴⁸⁻⁵⁰	16-26%
Arrêt du tabac ¹⁴	36%

Peur de la Nicotine ?

La Nicotine n'est pas le **problème** ... mais une étape de la **solution**

La nicotine est présente : Tabac, Substituts, Vape

Expérience des substituts nicotiques "classiques":

Placebo / substitut nicotique (*Méta-analyse*)

- **Pas d'augmentation du risque d'événements CV majeurs**
- Augmentation du risque d'événements CV de sévérité clinique moins importante (*palpitations*)

=> **Innocuité des substituts nicotiques** chez les patients CV

VAPE (cigarette électronique) – Toxicité des e-liquides ?

Composition des e-liquides:

Nicotine-base : le plus souvent

Sels de nicotine : plus rarement

Max 20 mg/ml

FIGURE 7 : EXEMPLE DE COMPOSITION D'UN E-LIQUIDE EN 2003

VAPE (cigarette électronique) – Toxicité des e-liquides ?

The infographic compares the chemical composition of a cigarette and an e-liquid bottle. On the left, a cigarette is shown with lines pointing to various toxic substances. On the right, an e-liquid bottle labeled 'KOOLSH' is shown with lines pointing to its ingredients.

Substance	Description	Substance	Description
ACÉTALDÉHYDE	(irritant des voies respiratoires)	ACIDE CYANHYDRIQUE	(était employé dans les chambres à gaz)
ACROLÉINE	(irritant des voies respiratoires)	TOLUIDINE	
ACÉTONE	(dissolvant)	AMMONIAC	(détergent)
NAPHTYLAMINE		URÉTHANE	
MÉTHANOL	(carburant pour fusée)	TOLUÈNE	(solvant industriel)
PYRÈNE		ARSENIC	(poison violent)
DIMÉTHYLNITROSAMINE		DIBENZACRIDINE	
NAPHTALÈNE	(antimite)	PHÉNOL	
NICOTINE	(utilisée comme herbicide et insecticide)	BUTANE	
CADMIUM	(utilisé dans les batteries)	POLONIUM 210	(élément radioactif)
MONOXYDE DE CARBONE	(gaz d'échappement)	STYRÈNE	
BENZOPYRÈNE		DDT	(insecticide)
CHLORURE DE VINYLE	(utilisé dans les matières plastiques, diminution de la libido)	GOUDRONS	(les plus cancérigènes)
MERCURE	(thermomètre)	PLOMB	(essence et gaz d'échappement)
		NICOTINE	(avec ou sans)
		EAU PURIFIÉ	
		ALCOOL	
		PG / VG	(produits alimentaires)
		ARÔMES	(naturels dans nos eJuces)

KOOLSH
PREMIUM E-JUICE
— PARIS —

VAPE (cigarette électronique) – Toxicité des e-liquides ?

Vapeur des e-cigarettes:

Pas de goudron

Pas de monoxyde de carbone

Si la solution est exagérément chauffée (> 250°C) :

Radicaux libres (*100 à 1000 fois moins*)

Formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine, toluène, nitrosamines (*9 à 450 fois moins*)

- Toxicité comparée vape/tabac ? 95% moins toxiques (rapport 2015 Public Health England)

VAPE (cigarette électronique) – Questions/réponses

- Moyen de sortie du tabac ? OUI

	2018
Grande Bretagne	14,7%
France	32%

- Porte d'entrée dans le tabagisme ? NON

(Il ne reste plus que 5% de fumeur à la sortie du lycée aux USA)

(2.7% des vapoteurs réguliers sont devenus des fumeurs réguliers)

- Les vaporisateurs et les liquides de vape sont-ils des produits fiables ? OUI

- *Faut-il* interdire les arômes *dans les liquides de vape* ? NON

VAPE (cigarette électronique) – Place de la vape

Les recommandations :

Fumeur **sans traitement**

=> Traitements validés d'aide à l'arrêt du tabac en première intention

Patient qui **n'arrive pas à être à zéro cigarette** avec les autres traitements

=> ajoutez la vape

Vapo-fumeurs

=> Proposer d'y associer les traitements validés

VAPE (cigarette électronique) – Place de la vape

Mais aussi... :

Laisser aux patients le choix de l'outil de sevrage => meilleure adhésion

Patient manifestement décidé à utiliser la vape => **encouragez-le**

VAPE (cigarette électronique) – Comment vapoter ?

Objectif zéro cigarette (+++)

- Nécessite un **apprentissage**, parfois long (*comme le tabac*)
- Le **plaisir** doit être favorisé !!! Il faut aimer vapoter sinon on revient vers la cigarette
- Le goût doit plaire
- La **dose de nicotine** doit être suffisante pour ne pas être en manque (+++)
- Dose la plus forte de nicotine supportée pour éviter le vapotage continu
- Favoriser le vapotage à l'extérieur.

VAPE (cigarette électronique) – Comment vapoter ?

“Si je tousse avec la vape”

- Apprendre à vapoter : plus **lentement**
- Inspirer “Comme avec une paille”, **pas dans la gorge**
- **Ajuster les doses** de nicotine
  - En diminuant si trop fort (irritation, surdosage)
  - En augmentant si vapotage en continu
  - Essayer des doses différentes

VAPE (cigarette électronique) – Limites de la vape

➤ Tabagisme = addiction

- Prise en charge **globale**
- Evolution **non linéaire**

➤ Vapotage

- Nécessite un apprentissage, parfois long (*comme la cigarette*)
- Après le tabac, il faut ensuite **aider à sortir de la vape**
- **Poursuivre** l'accompagnement

VAPE (cigarette électronique) – Comment sortir de la vape ?

Plusieurs mois.... Plusieurs années

Poursuivre la vape tant que le risque de reprise du tabac existe !

- Pas d'urgence, prendre le **temps** nécessaire
- Diminuer **la fréquence** de vapotage **avant** de diminuer **la dose** de nicotine
- **S'habituer** au comportement sans la vape
- Ne garder la vape qu'aux **moments à risque** : en soirée, lors de fortes envies de fumer le tabac

VAPE (cigarette électronique) – QUELLES ORIENTATIONS ?

CSAPA et Consultations de tabacologie
Boutiques de vape
Groupes d'utilisateurs et Proches utilisateurs

Centres de Tabacologie à Nice

www.addictaide.fr

www.drogues.gouv.fr (Mildeca)

Informations pratiques et pour les "militants"

<https://fr.vapingpost.com>

Produits à éviter = IQOS "tabac chauffé"

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Dr Gilles NIVOLLET

CSAPA – Centre hospitalier de Cannes

7 rue Teisseire – 06400 Cannes

g.nivollet@ch-cannes.fr